

ARBRES

Dans le cadre de la plantation de toutes les haies et massifs sur le territoire de la commune, liste fermée obligatoire des arbres autorisées, que la plantation soit effectuée par les particuliers ou les pouvoirs publics, que ce soit en zone résidentielle, en zone rurale ou dans les espaces verts communaux.

Dans le cadre de l'aménagement des jardins et des espaces verts communaux, lorsqu'il s'agit de plantations isolées qui ne correspondent pas à la situation du point précédent, liste indicative des arbres dont il faut s'inspirer mais dont il est possible de s'écarter.

Arbre de 1^{re} grandeur : arbre dont la hauteur à l'âge adulte est supérieure à 20 mètres

Arbre de 2^e grandeur : arbre dont la hauteur à l'âge adulte est comprise entre 10 et 20 mètres

Arbre de 3^e grandeur : arbre dont la hauteur à l'âge adulte est inférieure à 10 mètres

| Nom | | Dimension | | Utilisatio | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| Nom scientifique | Nom français | Hauteur (m) | grandeur | Têtard | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement | médicinale | comestible | mellifère | oiseaux |
| <i>Acer campestre</i> | Érable champêtre | 10-15 | 2 | | X | X | X | | | X | |
| <i>Acer platanoides</i> | Érable plane | 20-30 | 1 | | | X | X | | | X | |
| <i>Acer pseudoplatanus 1</i> | Érable sycomore | 25-30 | 1 | | | X | X | | | X | |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Aulne glutineux | 10-20 | 2 | X | | | X | | | | X |
| <i>Betula pendula</i> | Bouleau verruqueux | 20-30 | 1 | | | | X | X | | | X |
| <i>Betula pubescens</i> | Bouleau pubescent | 15-20 | 2 | | | | X | X | | | X |
| <i>Carpinus betulus</i> | Charme commun | 15-20 | 2 | X | X | X | X | | | | X |
| <i>Castanea sativa</i> | Châtaignier | 20-30 | 1 | | | X | X | X | X | X | |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Aubépine à deux styles | 5-6 | 3 | | X | X | X | X | | X | X |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Aubépine à un style | 8-10 | 3 | | X | X | X | X | | X | X |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Hêtre commun | 30-40 | 1 | | X | X | X | | X | | X |
| <i>Fraxinus excelsior 2</i> | Frêne commun | 25-40 | 1 | X | | X | X | X | | X | |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Houx | 5-10 | 3 | | X | X | X | | TOXIQUE | X | X |
| <i>Juglans regia</i> | Noyer royal | 15-25 | 1 | | | | X | X | X | | |
| <i>Malus sylvestris</i> | Pommier sauvage | 7-10 | 3 | | | X | X | | X | X | X |
| <i>Mespilus germanica</i> | Néflier | 4-6 | 3 | | X | X | X | X | X | X | |
| <i>Populus alba</i> | Peuplier blanc | 20-30 | 1 | X | | | X | | | | |
| <i>Populus canescens</i> | Peuplier grisard | 20-30 | 1 | | | | X | | | | |
| <i>Populus tremula</i> | Peuplier tremble | 25-30 | 1 | | | | X | | | | |
| <i>Prunus avium</i> | Merisier | 15-20 | 2 | | | X | X | | X | X | X |
| <i>Prunus cerasifera</i> | Myrobolan | 5-8 | 3 | | | X | X | | | X | X |
| <i>Prunus domestica insititia</i> | Prunier crêpe | 9 | 3 | | | X | X | | | X | X |
| <i>Prunus padus</i> | Cerisier à grappes | 10-15 | 2 | | | X | X | | X | X | X |
| <i>Pyrus communis</i> | Poirier sauvage | 15-20 | 2 | | | X | X | | X | X | X |
| <i>Quercus petraea</i> | Chêne sessile | 25-35 | 1 | X | X | X | X | X | | | X |
| <i>Quercus robur</i> | Chêne pédonculé | 25-35 | 1 | X | | X | X | X | | | X |
| <i>Salix alba</i> | Saule blanc | 20-25 | 2 | X | X | X | X | X | | X | |
| <i>Salix caprea</i> | Saule marsault | 6-10 | 3 | | | X | X | | | X | |

ARBRES

| Nom | | Dimension | | Utilisatio | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| Nom scientifique | Nom français | Hauteur (m) | grandeur | Têtard | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement | médicinale | comestible | mellifère | oiseaux |
| <i>Salix fragilis</i> | Saule fragile | 10-15 | 2 | X | X | | X | | | X | |
| <i>Sorbus aria</i> | Alisier blanc | 12-15 | 2 | | | X | X | | X | X | X |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Sorbier des oiseleurs | 10-15 | 2 | | | X | X | | X | | X |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Alisier torminal | 10-20 | 2 | | | X | X | | | X | X |
| <i>Taxus baccata</i> ¹ | If | 10-15 | 2 | | X | X | X | | TOXIQUE | | X |
| <i>Tilia cordata</i> | Tilleul à petites feuilles | 20-25 | 1 | | | | X | X | | X | |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Tilleul à grandes feuilles | 30-35 | 1 | | | | X | X | | X | |
| <i>Ulmus minor</i> ³ | Orme champêtre | 20-30 | 1 | X | | | X | | | | |
| <i>Ulmus glabra</i> ³ | Orme des montagnes | 25-35 | 1 | X | | | X | | | | |

¹ toxique pour les chevaux

² Sensible à la chararose

³ Sensible à la graphiose

ARBUSTES

Dans le cadre de la plantation de toutes les haies et massifs sur le territoire de la commune, liste fermée obligatoire des arbres autorisées, que la plantation soit effectuée par les particuliers ou les pouvoirs publics, que ce soit en zone résidentielle, en zone rurale ou dans les espaces verts communaux.

Dans le cadre de l'aménagement des jardins et des espaces verts communaux, lorsqu'il s'agit de plantations isolées qui ne correspondent pas à la situation du point précédent, liste indicative des arbres dont il faut s'inspirer mais dont il est possible de s'écarter.

| Nom | | Utilisation | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| Nom scientifique | Nom français | Hauteur (m) | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement | médicinale | comestible | mellifère | oiseaux |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Épine-vinette | 3-4 | X | X | X | | | X | X |
| <i>Buxus sempervirens</i> | Buis | 2-4 | X | | | | | X | |
| <i>Calluna vulgaris</i> | Bruyère commune | 0,2-1 | | | | | | X | |
| <i>Cornus mas</i> | Cornouiller mâle | 6-8 | X | X | X | | X | X | X |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Cornouiller sanguin | 3-4 | X | X | X | | | X | X |
| <i>Corylus avellana</i> | Noisetier | 6-8 | | X | X | | X | X | X |
| <i>Cydonia oblonga</i> | Cognassier | 5-6 | X | X | X | X | X | X | |
| <i>Cytisus scoparius</i> | Genêt à balais | 2-3 | | X | X | | | X | |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Fusain d'Europe | 3-6 | X | X | X | | TOXIQUE | X | X |
| <i>Frangula alnus</i> | Bourdaie | 3-5 | | X | X | X | TOXIQUE | X | X |
| <i>Ligustrum vulgare 1</i> | Troène commun | 3-5 | X | X | X | | TOXIQUE | X | X |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Camérisier | 2-3 | | X | X | | TOXIQUE | X | X |
| <i>Prunus cerasus</i> | Griottier | 5-6 | | X | X | | X | X | X |
| <i>Prunus spinosa</i> | Prunellier | 4-5 | X | X | X | | X | X | X |
| <i>Ribes nigrum</i> | Cassissier | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>Ribes rubrum</i> | Groseiller rouge | 1,5 | X | X | X | | X | X | X |
| <i>Ribes uva-crispa</i> | Groseiller à maquereau | 1,2 | X | X | X | | X | X | X |
| <i>Ribes uva-crispa x nigrum</i> | Josta | 1,5 | X | X | X | | X | X | X |
| <i>Rosa agrestis</i> | Rose des haies | 3 | | X | X | | | X | |
| <i>Rosa arvensis</i> | Rose des champs | 0,5-2 | | X | X | | | X | X |
| <i>Rosa canina</i> | Églantier commun | 3-4 | X | X | X | X | X | X | X |
| <i>Rosa rubiginosa</i> | Églantier odorant | 2-3 | | X | X | | | X | |
| <i>Rosa elliptica</i> | Rose sans odeur | 2,5 | | X | X | | | X | |
| <i>Rosa micrantha</i> | Rose à petites fleurs | 3,5 | | X | X | | | X | |

ARBUSTES

| Nom | | Utilisation | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| Nom scientifique | Nom français | Hauteur (m) | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement | médicinale | comestible | mellifère | oiseaux |
| <i>Rosa tomentosa</i> | Rose tomenteuse | 3 | | X | X | | | X | |
| <i>Rubus idaeus</i> | Framboisier | 1-1,5 | | X | X | | X | X | X |
| <i>Rubus fruticosus</i> | Ronce commune | 3 | X | X | X | | | X | X |
| <i>Salix atrocinerea</i> | Saule roux | 6 | | | X | | | | |
| <i>Salix aurita</i> | Saule à oreillettes | 1,5-3 | | X | X | | | X | |
| <i>Salix cinerea</i> | Saule cendré | 3-6 | | X | X | | | X | |
| <i>Salix purpurea</i> | Osier rouge | 3-5 | X | X | X | | | X | |
| <i>Salix triandra</i> | Saule à trois étamines | 3 | | X | X | | | X | |
| <i>Salix viminalis</i> | Saule des vanniers | 3-8 | X | X | X | | | X | |
| <i>Sambucus nigra</i> | Sureau noir | 8-10 | | X | X | X | X | X | X |
| <i>Sambucus racemosa</i> | Sureau à grappes | 4-5 | | X | X | | | X | X |
| <i>Ulex europaeus</i> | Ajonc d'Europe | 1-2 | | X | X | | | | |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> | Myrtille | 0,6-1 | | | | X | X | | X |
| <i>Viburnum lantana</i> | Viorne lantane | 1,5-3,5 | X | X | X | | | X | X |
| <i>Viburnum opulus</i> | Viorne obier | 4 | X | X | X | | | X | X |

PLANTES GRIMPANTES

| Nom | | Utilisation | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| Nom scientifique | Nom français | Hauteur (m) | Haie taillée | Haie libre | Bande boisée et alignement | médicinale | comestible | mellifère | oiseaux |
| <i>Clematis vitalba</i> | Clématite des haies | 30 | | X | X | | | | |
| <i>Hedera helix</i> | Lierre | 30 | | X | X | X | TOXIQUE | X | X |
| <i>Humulus lupulus</i> | Houblon | 6 | | X | X | X | | | |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Morelle douce-amère | 1,5 | | X | X | | TOXIQUE | | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> | Chèvrefeuille des bois | 3-6 | | X | X | | TOXIQUE | X | X |

¹ toxique pour les chevaux

FRUITIERS

Liste des variétés RGF (Ressources Génétiques Fruitières) sélectionnée par le Centre de Recherche agronomique de Gembloux pour la robustesse, une bonne tolérance aux principales maladies mais aussi une diversité et une originalité d'arômes et d'usages.

Pour plus d'information : <http://certifruit.be/>

| | |
|------------|--|
| Haute-tige | Arbre dont la hauteur de tronc est d'environ 1,80 à 2 m Distance de plantation : 12-15 m |
| Demi-tige | Arbre dont la hauteur de tronc est d'environ 1,20 m Distance de plantation : 6-8 m ou 12-15 m (en fonction du porte-greffe) |
| Basse-tige | Arbre dont la hauteur de tronc est d'environ 0,60 m Distance de plantation : 2-4 m |

Pommier

'Cwastresse Double'
'Geneva'
'Godivert'
'Grenadier'
'Gris Braibant'
'Joseph Musch'
'La Paix'
'Président H. Van Dievoet'
'Président Roulin'
'Radoux'
'Reinette de Bleinheim'
'Reinette de Waleffe'
'Reinette Dubois'
'Reinette Evagil'
'Reinette Hernaut'
'Transparente de Lesdain'

Prunier

'Belle de Thuin'
'Wignon'
'Prune de Prince'
'Sainte Catherine'

Poirier

'Bronzée d'Enghien'
'Madame Grégoire'
'Nec Plus Meuris'
'Précoce Henin'
'Saint Mathieu'
'Beurré Dilly'
'Poire de Gros'

Pêcher

'Fertile de Septembre'

Cerisier

'Bigarreau Ghijssens'
'Helshoven'
'Griotte de Shaerbeek'